

Хэрэглэгчдэд зориулсан эм хэрэглэх заавар

ФЕНКАРОЛ 50мг шахмал

Квифенадин

Энэхүү заавар нь танд хэрэгцээтэй, чухал мэдээлэл агуулсан байгаа тул эмийн бэлдмэлийг хэрэглэж эхлэхийн өмнө анхааралтай уншина уу.

Энэхүү бэлдмэлийг уг зааварт бичсэн удирдамж, эсвэл эмч болон эм зүйч танд зөвлөсөний дагуу хэрэглэх хэрэгтэй.


- Энэхүү зааврыг хадгалаарай. Танд дахин унших хэрэгцээ гарч мэднэ.
- Илүү их мэдээлэл болон зөвлөгөө авах шаардлагатай бол та эм зүйчид хандаарай.
- Хэрэв Танд ямар нэг гаж нөлөө илэрвэл эмч болон эм зүйчдээ мэдэгдэж, зөвлөгөө аваарай. Үүнд энэхүү зааварт дурьдагдаагүй бусад гаж нөлөө ч хамаатай болно. 4-р хэсгийг үзнэ үү.
- Хэрэв эмийн бэлдмэлийг хэрэглээд 2-3 хоногийн дараа таны биеийн байдал сайжрахгүй, эсвэл улам дордоод байвал та эмчид хандаарай.

Энэхүү зааврын агууламж:

- 1.Фенкарол гэж юу вэ? Ямар үед хэрэглэх вэ?
- 2.Фенкарол бэлдмэлийг хэрэглэхийн өмнө та юу мэдэж байвал зохилтой вэ?
- 3.Фенкарол бэлдмэлийг хэрхэн хэрэглэх вэ?
- 4.Илэрч болзошгүй гаж нөлөө
- 5.Фенкарол бэлдмэлийг хэрхэн хадгалах вэ?
- 6.Савлагааны агууламж ба бусад мэдээлэл

1. Фенкарол гэж юу вэ? Ямар үед хэрэглэх вэ?

Фенкарол бэлдмэлийн идэвхитэй үйлчлэгч бодис нь квифенадины гидрохлорид (цаашид квифенадин) юм. Энэ нэгдэл нь гистамины эсрэг эмийн бүлэгт хамаарагдана (харшлын эмчилгээний бэлдмэл). Энэ бүлгийн бусад эмийн бэлдмэлтэй харьцуулахад квифенадин нь үйлдлийн хоёр механизмтай. Тийм учраас бусад төрлийн гистамины эсрэг бэлдмэл үйлчилдэггүй хүмүүст энэхүү бэлдмэл үр дүнтэй байдаг. Квифенадин нь төв мэдрэлийн тогтолцоог дарангуйлах нөлөө үзүүлдэггүй. Гэхдээ бага зэргийн тайвшруулах нөлөө зарим тохиолдолд ажиглагдаж болно.



Энэхүү бэлдмэлийг поллиноз (ургамлын харшил), цочмог болон архаг чонон хөрвөс (загатнаат улайлт), харшлын ринит (хамар битүүрэх), харшлын конъюнктивит (зовхины дотор талд нүдний салстын үрэвсэл), судаслаг хаван (ам, хэл, уруул, залгиур хавагнаснаас амьсгалах болон залгихад хүндрэлтэй болох), арьсны гэмтэл (дерматоз, экзем, нейродерматит), арьсны загатнаа, хүнс болон эмийн гаралтай харшлын урвалуудыг эмчлэхэд хэрэглэнэ.

2. Фенкарол бэлдмэлийг хэрэглэхийн өмнө та юу мэдэж байвал зохилтой вэ?

Фенкаролыг дараах тохиолдолд хэрэглэхийг хориглоно:

- Хэрэв та квифинадин болон энэ эмийн бэлдмэлийн найрлага дахь аль нэг нэгдэлд харшилтай бол (6-р хэсэгт бичигдсэн),
- Жирэмсний эхний гурван сардаа байгаа (жирэмсний бусад саруудад ч гэсэн энэ бэлдмэлийг хэрэглэхийг зөвлөдөггүй),
- Хэрэв та хөхүүл хүүхэдтэй бол.

Анхааруулга ба сэрэмжлүүлэг

Фенкарол бэлдмэлийг хэрэглэхийн өмнө эмчлэгч эмч болон эм зүйчтэй дараах тохиолдолд ярилцаж зөвлөгөө аваарай:

- Хэрэв та зүрх судасны хурц, цочмог өвчтэй бол
- Хэрэв та хоол боловсруулах замын хурц, цочмог өвчтэй бол
- Хэрэв та элэг ба/эсвэл бөөрний хурц, цочмог өвчтэй бол

Хүүхэд ба насанд хүрэгсэд

Хүүхэд ба насанд хүрэгсэд Фенкарол бэлдмэлийн нэгж тундаа идэвхитэй үйлчлэгч бодисын өөр өөр агууламжтай, хүүхдэд бага тунтай эмийн бодисыг хэрэглэхийг зөвлөдөг.

Фенкарол ба бусад эмийн бэлдмэлүүд

Хэрэв та одоо өөр эмийн бэлдмэл хэрэглэдэг, саявтархан хэрэглэсэн, эсвэл хэрэглэж магадгүй байгаа бол эмчлэгч эмч эсвэл эм зүйчдээ хандах хэрэгтэй.

Фенкарол нь төв мэдрэлийн тогтолцоонд ховсын дарангуйлах нөлөөг ихэсгэдэггүй. Энэ эмийн бэлдмэл нь хоол боловсруулах замын хөдөлгөөний идэвхийг бууруулах болон удаан шимэгддэг эмийн бодисуудын гэдэсний шимэгдэлтийг ихэсгэх (цусны судсанд цусны бүлэн үүсэлтээс хамгаалдаг



бэлдмэлүүд (кумарины төрлийн цус бүлэгнэлтийн эсрэг бэлдмэлүүд)) үйлдэлтэй.

Фенкаролыг хоол болон архи согтууруулах ундаатай хэрэглэх нь

Хоол хүнстэй энэ эмийн бэлдмэлийн харилцан үйлчлэлийн талын судалгаа байхгүй байна.

Фенкарол нь төв мэдрэлийн тогтолцоонд архи, согтууруулах ундааны дарангуйлах нөлөөг ихэсгэдэггүй.

Жирэмсэн ба хөхүүл үеийн хэрэглээ

Хэрэв та жирэмсэн эсвэл хөхүүл хүүхэдтэй, эсвэл жирэмсэн байж магадгүй, эсвэл жирэмслэхээр төлөвлөж буй бол энэ эмийн бэлдмэлийг хэрэглэхийн өмнө эмч болон эм зүйчээс зөвлөгөө авах хэрэгтэй.

Энэ эмийн бэлдмэлийг жирэмсний эхний гурван сартайд хэрэглэж болохгүй. Мөн жирэмсний бусад үеүдэд ч хэрэглэхийг зөвлөдөггүй ("Фенкаролыг хэрэглэж болохгүй заалт"-ыг харна уу).

Квифенадин эхийн хөхний сүүгээр ялгардаг эсэх нь тодорхойгүй байна. Тийм учраас энэ эмийн бэлдмэлийг хөхүүл ээж хэрэглэж болохгүй ("Фенкаролыг хэрэглэж болохгүй заалт"-ыг харна уу).

Машин жолоодох үеийн хэрэглээ

Мэргэжлийн ур чадвар нь ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ үйлийн хурд шаардсан ажил эрхэлдэг эмчлүүлэгчид энэ эмийг хэрэглэхэд нойр хүргэж байгаа эсэхийг шалгах үүднээс эмчилгээ эхлэхээс өмнө богино хугацаанд эмийг хэрэглэж үзэх хэрэгтэй. Хэрэв тийм нөлөө үзүүлж байвал энэ эмчилгээний үед жолоо барихаас зайлсхийх хэрэгтэй.

Фенкарол нь сахароз агуулдаг


Хэрэв танд эмч өмнө нь таныг зарим нүүрсусанд үлтэвчилтэй гэж хэлж байсан бол энэ эмийг хэрэглэхээсээ өмнө эмчтэйгээ уулзаж зөвлөгөө авах хэрэгтэй.

3. Фенкарол бэлдмэлийг хэрхэн хэрэглэх вэ?

Энэхүү бэлдмэлийг зөвхөн уг зааварт бичсэн удирдамж, эсвэл эмч болон эм зүйч танд зөвлөсөний дагуу хэрэглэх хэрэгтэй. Хэрэв танд эргэлзээтэй байвал эмч болон эм зүйчтэйгээ зөвлөөрэй.

Фенкаролыг шууд хоолны дараа хэрэглэнэ.

Насанд хүрэгсдэд тун нь 25-50мг, өдөрт 2-4 удаа хэрэглэнэ. Хоногийн хамгийн дээд тун 200мг байна.



Өсвөр үеийнхэнд (12-18 насны) тун нь 25мг, өдөрт 2-3 удаа хэрэглэнэ.

Ээлж эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 10-20 өдөр байна. хэрэв шаардлагатай бол ээлж эмчилгээг давтаж болно.

Хэрэв 25мг тун шаардлагатай бол Фенкарол бэлдмэлийн 25мг-тай шахмалыг хэрэглэх нь зүйтэй.

Хэрэв энэ эмийн бэлдмэлийн үйлчлэл дэндүү хүчтэй, эсвэл хэт сул юм шиг санагдвал та эмчлэгч эмч эсвэл эм зүйчдээ хандаарай.

Хэрэв та Фенкарол бэлдмэлийг хэрэглэх ёстойгоосоо илүү ихээр хэрэглэсэн бол

Хэрэв та Фенкарол бэлдмэлийг хэрэглэх ёстойгоосоо илүү ихээр хэрэглэсэн бол эмчтэйгээ зөвлөлдөөрэй. Их тунгаар хэрэглэсэнээс болж салст бүрхүүл хуурайших, толгой өвдөх, дотор муухайрах, бөөлжих, аюулхайд өвдөх, хоол боловсруулалтын бусад алдагдал илэрч болзошгүй.

Хэрэв Фенкарол бэлдмэлээ хэрэглэхээ мартсан бол

Мартсан тунгаа нөхөж уухын тулд давхар тунгаар хэрэглэж болохгүй

Хэрэв Фенкарол бэлдмэлийг хэрэглэхээ зогсоож байгаа бол

Энэ эмийн бэлдмэлийг хэрэглэх эсэх талаар ямар нэг асуулт байгаа бол эмчлэгч эмч болон эм зүйчдээ хандана уу.

4. Илэрч болох гаж нөлөө

Бусад эмийн бэлдмэлийн нэгэн адил энэ эмийн бэлдмэл нь гаж нөлөө үзүүлж болох ч бүх хүнд адилхан илэрдэггүй.

Элбэг тохиолдох: (10 хүнээс 1 хүртэл хүнд тохиолдоно):


- Ам хатах.

Хаяа илрэх (100 хүнээс 1 хүртэл хүнд тохиолдоно):

- Толгой өвдөх, нойрмоглох;
- Хоол боловсролт алдагдах (дотор муухайрах, бөөлжих), энэ шинж тэмдэг нь ихэнхдээ тун бууруулах болон эмийн хэрэглээг зогсооход арилна.

Гаж нөлөөг мэдээлэх нь

Хэрэв танд ямар нэг гаж нөлөө илэрвэл эмч болон эм зүйчдээ хандаарай. Үүнд энэхүү зааварт дурьдагдаагүй аль ч гаж нөлөө хамаарна. Түүнээс гадна илэрч буй гаж нөлөөг бүртгэх Үндэсний мэдээлэх тогтолцоог ашиглан өөрт илэрсэн гаж нөлөөг мэдээлж болно. Ингэж гаж нөлөөг мэдээлснээрээ та энэхүү эмийн



бэлдмэлийн аюулгүй байдлын талаар илүү мэдээлэл цуглуулахад тусалж байна гэсэн үг юм.

5. Фенкарол бэлдмэлийг хэрхэн хадгалах вэ?

25 °C-аас ихгүй хэмд хадгална.

Гэрлийн шууд тусгал болон чийгнээс хамгаалсан газарт, үйлдвэрлэгчийн савлагаанд нь хадгална.

Хүүхдэд харагдахгүй, гар хүрэхээргүй газар хадгална.

Хатуу цаасан хайрцаг дээр EXP бичиглэлийн ард бичигдсэн хүчинтэй хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд энэхүү бэлдмэлийг хэрэглэж болохгүй. Хүчинтэй хугацаа тухайн сарын сүүлийн өдрийг заана.

Аль ч эмийн бодисыг урсгал ус болон ахуйн хогонд хийж хаяж болохгүй. Хэрэглэхээ больсон эмийн бэлдмэлийг хэрхэн устгах талаар эм зүйчээс зөвлөгөө аваарай. Энэ арга хэмжээ нь хүрээлэн байгаа орчноо бохирдуулахаас хамгаална.

6. Савлагааны агууламж ба бусад мэдээлэл

Фенкаролын агууламж:

- Идэвхитэй үйлчлэгч бодис нь квифенадины гидрохлорид юм (*Quifenadini hydrochloridum*).

Нэг шахмал бүрт 50мг квифенадины гидрохлорид агуулагдана.

- Бусад туслах бодис нь төмсний цардуул, сахароз, желатинжуулсан цардуул, кальцийн стеарат байдаг.

Фенкарол бэлдмэлийн дүрслэл ба савлагаан дахь агууламж

Цагаан, бараг цагаан өнгөтэй, дугуй, налуу ирмэгтэй хавтгай шахмал.

Нэг блистерт 15 шахмал агуулагдана.

1 блистер (15 шахмал) эм хэрэглэх зааврын хамтаар хатуу цаасан хайрцагт агуулагдана.

Үйлдвэрлэл ба борлуулалт хариуцсан байгууллага:

JSC "Olainfarm"

5 Rupnicu Str., Olaine, LV-2114, Латви улс

Утас.: +371 67013705

Fax: +371 67013777

e-mail: olainfarm@olainfarm.lv

Энэхүү заавар хамгийн сүүлд хянагдсан огноо: 02/2018

